

外来診療日割表

野上病院

平成22年11月現在

科目	時間	月	火	水	木	金	土	日
内科	9~12	林	上野	石橋(糖尿)	林	川口・林	上野	/
	2~5	上野	林(プラセンタ)	石橋(糖尿)川口	川口・大野(基)武田(肝臓)	/	/	/
循環器内科	9~12	葭川	葭川	葭川	/	/	葭川	/
	2~5	/	/	/	/	葭川	/	/
外科	9~12	金川	小畑	院長	金川	院長・大川	小畑	/
	2~5	手術	大川	金川	手術	小畑(2~4時)院長(4~5時)	/	/
女性外来	5:15~6:45	/	/	金川(第2・4のみ)	/	/	/	/
眼科	9~12	鈴木	/	/	岡崎	鈴木	京大(第1・3)	/
	9~11:30	/	鈴木	鈴木	/	/	日赤(第2・4・5)	/
	2~4	/	/	/	岡崎	/	/	/
	2~5	鈴木	/	/	/	手術	/	/
耳鼻咽喉科	9~12	大野(聡)	/	大野(聡)	大野(聡)	箕輪	山根	/
	2~5	大野(聡)	大野(聡)	/	森中	/	/	/
皮膚科	9~12	西山	/	西山	/	国本	西山・国本交替制	松中(第1)
泌尿器科	9~12	/	/	/	楠見	/	稲垣(第1・3)上門(第2・4)	/
	10~13	西澤	/	/	/	/	/	/
脳神経外科	9~12	/	/	/	寺本	/	平山	/
リウマチ科	2~4	/	/	西村	/	/	/	/
リハビリテーション科	9~12	坂口	坂口	西村	平野	坂口	川口	/
リハビリ	9~12	○	○	○	○	○	○	/

※内科・循環器科・外科の診察は、一部予約制となります。※診察時間の変更等もありますので、ご確認ください。

のがみ泉州リハビリテーションクリニック

科目	時間	月	火	水	木	金	土	日
整形外科	9~12	野上(倫)	西村(野上) 装具(野上)	野上(倫)	西村	野上(倫)	岡野(第2・4)田中(第1・3・5)	/
	4:30~7	野上(倫)	/	/	/	野上(倫)	/	/
	5~7:30	/	理事長	西村	/	/	/	/
内科	9~12	/	/	/	/	(プール検診)	/	/
	5~7:30	大野(基)	/	上野	/	林	/	/
リハビリ	9~12	○	○	○	○	○	○	/
	2~3:30	物療	物療	物療	物療	物療	/	/
	5~7	物療	物療	物療	/	物療	/	/



-発行-
2010年10月
-編集-
野上病院
院内新聞委員
泉南市樽井1-2-5
TEL 072-484-0007



アメリカ医療事情

9月に泉佐野泉南医師会看護専門学校のアメリカ研修旅行に付き添い、ロサンゼルス(LA)を訪問した。この研修はエルカミノ大学看護学部と全米No1にランクされたシーダー・サイナイ病院の現地研修が主なものである。特にシーダー・サイナイ病院ではER(救命救急室)とOR(手術室)を見学し、アメリカの医療事情を垣間見た。先ず人が多い、医師、看護師、コメディカルが豊富に配置されており、余裕をもった医療が展開されていた。特に看護師は豊富で、2時間働いたら、10分の休憩時間があり、確実に実施されていた。医師は自分のオフィスを持っており、手術の時は病院に向いて手術し、手術料を得るというシステムをとっている。術後管理は主にレジデントが行っている。手術内容は日本と殆ど変わらず、細かさにおいては日本の方が上と思われた。またnurse practitionerといって、訓練をつんで資格を得た看護師が医師に代わってある程度の医療行為を行う制度があり、例えば、腹水穿刺をしたり、中心静脈カテーテルをいれたりしていた。ただ非常にコストが高くつき、例えば虫垂切除で1日入院すると、軽く100万円は超える。あらためて日本の国民皆保険制度は素晴らしいと思う次第である。

院長 野上浩實



下剤の話

飲み合わせ、副作用を知っていますか?
便秘薬や下剤を服用している人は、多くいますが、服用の際注意しなくては
いけない事を知っていますか?

下剤といってもいろいろな種類があります。

- 刺激性下剤** … 腸の神経を刺激して腸の運動を高める。(センナ・ダイオウ・アロエ・ヨーデル・アローゼン・プルゼニドラキソベロンなど)
 - ・腸の神経を刺激して腸の運動を高める。
 - ・連用するうちに増量しないと効かなくなる。
 - ・妊婦には注意が必要なものや服用できないものもあるので注意。

- 膨張性下剤** … 便を膨張させ、かさを増す。(カンテン・プランタゴ・オバタなど)
 - ・胃で膨れるのでもたれた感じがする。多量の水で服用すること。
 - ・腸にポリープや狭窄があって腸が狭くなっている場合には、腸閉塞をおこすことがある。

- 塩類下剤** … 便をやわらかくする。(酸化マグネシウム・マグミットなど)
 - ・多量の水で服用することが必要です。
 - ・重大な副作用に高マグネシウム血症があります。高マグネシウム血症があらわれ、呼吸抑制、意識障害、不整脈、心停止に至ることがあります。悪心、嘔吐、口渇、血圧低下、除脈、皮膚潮紅筋力低下、筋力低下、傾眠等の症状の発現に注意するとともに、血清マグネシウム濃度の測定を行うなど十分な観察を行い、異常が認められた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。
 - ・テトラサイクリン系抗生物質、ニューキノロン系抗菌剤とは2~3時間開けて服用する。

*代表的なものをあげましたが、その他の薬は担当医に相談して下さい。(薬剤部 常國)